



Lavosept® gel

gelová forma alkoholového dezinfekčního přípravku pro hygienickou dezinfekci kůže.

Lavosept® je alkoholový dezinfekční přípravek ve formě čirého gelu, který obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky.

Díky balení s dávkovačem se pohodlně aplikuje, dobře se roztírá a nestéká z rukou.

Asi po 30 sekundách až 1 minutě přípravek zasychá. Je to doba potřebná pro zajištění dezinfekční účinnosti přípravku a zaručení potřebné ochrany pro pokožku.

Neobsahuje žádná barviva a parfěmy.

Různé velikosti balení jsou přizpůsobeny způsobu a účelu použití.

Přípravek je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým počtem osob -

v nemocnicích, ordinacích, ve stravovacích provozech, v potravinářských výrobcích, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech při manikúře,

modeláži umělých nehtů, pedikúře, tetování kůže, ve sportovních zařízeních, v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, wellness, při nákupu v supermarketu, při cestování atd.

Složení: Ve 100g je obsaženo 1-hexadecylpyridin-1-ium chlorid v minimální koncentraci pod 0,1 %, minimálně 75 g směsi alkoholu, glycerín, panthenol, hydroxypropylcelulóza.

Dezinfekční účinnost přípravku.

Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci.

Přípravky na dezinfekci pokožky se testují podle Practical Guide on Rationale and Testing Procedures for Desinfection of Hands podle materiálů a doporučení WHO. Virucidní účinnost se testuje suspenzí kvalitativní a semikvantitativní metodou na modelovém viru.

Používané metody jsou akreditované ČIA DLE ČSN EN ISO/IEC 17025.

Baktericidní a Fungicidní (mikroskopické kvasinkové a vláknité houby) účinnost – testováno na zástupcích gram pozitivních a gram negativních mikrobů - St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. Vulgaris S. marcescens, C. albicans

Virucidní – testováno na – E.coli bakteriofág φX 174-zástupce neobalených enterovirů (enteroviry způsobují např.. Hepatitidu A – E)

Návod k použití a dávkování.

Lavosept® se neředěný vtírá do pokožky v dostatečném množství, aby vznikl stejnoměrný vlhký film přípravku na ošetřované ploše. Ošetřovaná pokožka by měla být vlhká po dobu potřebnou podle požadavku na hygienickou či chirurgickou dezinfekci.

Hygienická dezinfekce 1 x 3ml roztoku necháme působit 30 sekund až 1 minutu.

Chirurgická dezinfekce 2 x 5 ml roztoku necháme působit 2 x 2,5 minuty.

Pokožka by měla být vlhká po dobu 5 minut

Přípravek **není vhodný** pro dezinfekci **poraněné kůže a otevřených ran.**

Balení: Láhev s dávkovačem 30 ml, láhev s dávkovačem 400 ml, náhradní náplň 500 ml, kanystr 5 l

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Skladování: skladujte v originálním balení, těsně uzavřeném, chraňte před slunečním světlem a tepelnými zdroji.

Neskladujte společně s potravinářskými výrobky a krmivými.

Výrobce: AMOENÉ s.r.o., IČ: 25868501 Boženy Němcové 1238, 742 58 Příbor, ČR,

tel/fax : +420556722202, e-mail:servis@amoene.cz, e-mail:info@amoene.cz

Registrace: Schváleno ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem : REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823

Výstražné symboly F Vysoce hořlavý
Xi Dráždivý

Bezpečnostní věty:

- R-věty: R11 Vysoce hořlavý
R36 Dráždí oči

R67 Vdechování par může způsobit ospalost

- S-věty: S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení

S 25 Zamezte styku s očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

