



Lavosept®- roztok

alkoholový dezinfekční přípravek pro hygienickou dezinfekci kůže.

Lavosept® je alkoholový dezinfekční přípravek ve formě roztoku, který obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky.

Díky balení ve spreji se pohodlně aplikuje na povrch kůže.

Po 60 sekundách po aplikaci je zajištěna dezinfekční účinnosti přípravku - baktericidní a fungicidní a po opakované aplikaci způsobem kdy pokožka zůstává vlhká po dobu 5 minut, je zaručena účinnost virucidní.

Neobsahuje žádná barviva a parfěmy.

Různé velikosti balení jsou přizpůsobeny způsobu a účelu použití. Přípravek je vhodný pro použití všude tam, kde dochází k potřebě dezinfekce neporaněné kůže - v kosmetických salónech při manikúře, modeláži umělých nehtů, pedikúře, tetování kůže.

Je vhodný též pro dezinfekci obuvi v hernách bowlingu a jinde, kde dochází k půjčování sportovní obuvi a náčiní.

Složení: Ve 100g je obsaženo 1-hexadecylpyridin-1-ium chlorid v minimální koncentraci pod 0,1 %, minimálně 75 g směsi alkoholu, glycerín, panthenol.

Dezinfekční účinnost přípravku.

Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci.

Přípravky na dezinfekci pokožky se testují podle Practical Guide on Rationale and Testing Procedures for Desinfection of Hands podle materiálů a doporučení WHO. Virucidní účinnost se testuje suspenzní kvalitativní a semikvantitativní metodou na modelovém viru.

Používané metody jsou akreditované ČIA DLE ČSN EN ISO/IEC 17025.

Baktericidní a Fungicidní (mikroskopické kvasinkové a vláknité houby) účinnost – testováno na zástupcích grampozitivních a gramnegativních mikrobů - St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. Vulgaris S. marcescens, C. albicans

Virucidní – testováno na – E.coli bakteriofág ϕ X 174-zástupce neobalených enterovirů (enteroviry způsobující např. Hepatitidu A – E,)

Návod k použití a dávkování.

Lavosept® se pomocí spreje aplikuje v dostatečném množství na ošetřované místo. Ošetřovaná pokožka by měla být vlhká po dobu potřebnou podle požadavku na hygienickou či chirurgickou dezinfekci.

Hygienická dezinfekce - roztok necháme působit 30 sekund až 1 minutu

Chirurgická dezinfekce - opakovaně aplikovaný roztok necháme působit 5 minut (2 x 2,5 minuty.)

Přípravek **není vhodný** pro dezinfekci **poraněné kůže a otevřených ran.**

Balení: Láhev s rozprašovačem 55 ml

Láhev s rozprašovačem 200 ml

Náhradní náplň 500 ml

Kanistr 5 l

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Skladování: skladujte v originálním balení, těsně uzavřeném, chraňte před slunečním světlem a tepelnými zdroji.

Neskladujte společně s potravinářskými výrobky a krmivem.

Výrobce: AMOENĚ s.r.o., IČ: 25868501 Boženy Němcové 1238, 742 58 Příbor, ČR,

tel/fax .+420556722202, e-mail: servis@amoene.cz, e-mail: info@amoene.cz

Registrace: Schváleno ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem :REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823

Výstražné symboly

F Vysoce hořlavý
Xi Dráždivý



Bezpečnostní věty:

- R-věty:

R 11 Vysoce hořlavý
R 36 Dráždí oči
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost

- S-věty:

S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení
S 25 Zamezte styku s očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc